

MINIMO DE VACUNAS REQUERIDAS*
PARA ASISTIR A LA ESCUELA – Septiembre 2006-Junio 2007
 (Se necesitan Mes, Dia y Año) WAC 246-100-166

Adapted from DOH materials.

GRADO	Varicela	DtaP / DTP / DT	POLIO	MMR	HEP B
Kindergarten	1 dosis puesta en o después del 1er cumpleaños O Informe de padres de haber tenido la enfermedad	4 dosis DTP/DtaP Siempre que la última dosis sea puesta en o después del 4º cumpleaños	3 dosis Siempre que la última dosis sea puesta en o después del 4º cumpleaños	Se recomienda 2 dosis de MMR, ambas puestas en o después del 1er cumpleaños y por lo menos 28 días aparte. 2 dosis Sarampión; 1 dosis Paperas & 1 dosis Rubeola ⁴ ambas puestas en o después del 1er cumpleaños y por lo menos 28 ds. aparte	3 dosis
Grados 1-5	No es requerida	Td / Tdap			
Grado 6	1 dosis puesta en o después del 1er cumpleaños O Informe de padres de haber tenido la enfermedad	Pertussis No es requerida o después del 7º cumpleaños			
Grados 7-9	No es requerida	3 dosis DTaP/DTP/DT/Td Siempre que la última dosis sea puesta en o después del 4º cumpleaños			
Grados 10-12					No es requerida

No hay un intervalo máximo entre dosis. No es necesario recomenzar la serie si hay un intervalo más largo del recomendado. Referirse al Programa de Vacunas Para la Niñez Recomendado para 2005 [http://www.cdc.gov/nip/shild-schedule.h:tm#Printable](http://www.cdc.gov/nip/shild-schedule.htm#Printable).

Hepatitis B: Se recomienda:

- 2ª dosis puesta 1-3 meses después de la 1ª
- 3ª dosis puesta 2-6 meses después de la 2ª, pero
- 3ª dosis no debería ser puesta menos de 4 meses después de la 1ª, y
- 3ª dosis no debería ser puesta antes de las 24 semanas de vida

”El Programa de Inmunización del Estado de Washington está usando un “período de gracia” de 4 días con el SOLO propósito de permitirle cumplir con los requisitos mínimos, evaluación y revisión de registros.